

HIV eruzioni cutanee Rimedi domestici



Carol Lyon

HIV eruzioni cutanee Rimedi domestici



Carol Lyon

HIV eruzioni cutanee Rimedi domestici

Per molte persone appena infettate dall'HIV, un'eruzione cutanea è uno dei primi sintomi. Una vasta gamma di malattie, infezioni e reazioni allergiche può irritare la pelle, tuttavia, quindi un'eruzione cutanea da sola non è mai sufficiente per diagnosticare l'HIV.

I sintomi dell'eruzione da HIV si manifestano generalmente nelle persone che hanno contratto il virus HIV.

Sfortunatamente questo sintomo specifico dell'HIV è uno dei sintomi che compaiono, il che significa che l'infezione da HIV è arrivata al suo

stadio finale prima di trasformarsi in AIDS.

L'eruzione da HIV può essere descritta come un tipo di eruzione cutanea che una persona con infezione da HIV può vedere sulla sua pelle. Ci sono anche casi in cui l'eruzione cutanea è apparsa a causa dei medicinali che la persona interessata prende per mantenere la malattia sotto controllo. Secondo alcune ricerche, circa l'85% delle persone con infezione da HIV subirà un'eruzione cutanea in un momento della loro vita.



L'eruzione da infezione da HIV può essere descritta come una piccola chiazza di pelle leggermente sollevata con piccoli dossi. La principale differenza tra questa eruzione cutanea specifica e altri tipi di eruzioni cutanee è la colorazione che varia del tono della pelle della persona infetta. Se la persona infetta ha un colore della pelle chiaro o

pallido, l'eruzione è di solito da rosso scuro a rosso-marrone.

Se la persona interessata ha il colore della pelle scura, l'eruzione è da marrone scuro a viola-nero. L'eruzione da HIV di solito appare 2-3 settimane dopo l'infezione e non è così rara tra le persone. Purtroppo è considerato uno dei sintomi tardivi dell'HIV. Per questo motivo, è intelligente conoscere i sintomi dell'HIV e chiedere sempre l'aiuto del medico. Questo vale anche per altre malattie e infezioni, perché se reagisci in tempo ci sono possibilità che eliminerai la malattia nella sua fase iniziale o almeno la manterrai sotto controllo.



L'eruzione cutanea che appare generalmente nelle persone con infezione da HIV rende la pelle squamosa e secca. A volte è simile a un brutto caso di psoriasi. I sintomi dell'eruzione da HIV nelle donne sono seguiti da piaghe o verruche genitali. I sintomi e i segni dell'eruzione da HIV nelle donne sono abbastanza simili ai sintomi negli uomini. Includono piaghe o verruche genitali.

I sintomi dell'eruzione da HIV acuta sono desquamazione della pelle che può portare a piaghe e vesciche sui genitali. Oltre ai genitali, l'eruzione da HIV può anche apparire sul viso e questo accade principalmente nelle fasi iniziali del trattamento. Questa eruzione cutanea come sintomo dell'infezione da HIV è preziosa poiché aumenta le possibilità di una diagnosi precisa. Questo in realtà significa che ci sono molte persone che si sono abituate a convivere con l'HIV.

Contenuto:

Sintomi dell'HIV che tutti devono sapere

Come curare le eruzioni da HIV acute

Sintomi e cura

Cosa fare a casa?

Rimedi naturali per curare il prurito e rimuovere le eruzioni cutanee

Sintomi dell'HIV che tutti devono sapere

Sintomi dell'HIV

Il virus dell'immunodeficienza umana o l'HIV attacca il sistema immunitario che combatte le infezioni. Senza trattamento, l'HIV può portare all'AIDS (sindrome da

immunodeficienza acquisita). All'inizio dell'epidemia di AIDS negli anni '80, le persone che erano state infettate dall'HIV passarono rapidamente a malattie gravi. Ma i trattamenti di oggi aiutano a ridurre la quantità di virus nel sangue, in modo che le persone sieropositive possano vivere più sane, vivere più a lungo e non necessariamente progredire verso l'AIDS.

Più di un milione di persone negli Stati Uniti vivono con l'HIV e, a malapena, uno su sette non sa di averlo. I sintomi dell'HIV possono essere difficili da rilevare. Entro un mese o due dall'HIV che entra nel corpo, dal 40% al 90%

delle persone manifesta sintomi simil-influenzali noti come sindrome retrovirale acuta (ARS). Ma a volte i sintomi dell'HIV non compaiono per anni, o addirittura un decennio, dopo l'infezione.

"Nelle prime fasi dell'infezione da HIV, i sintomi più comuni sono nessuno. Fino a una persona su cinque con l'HIV non sa di averlo. Ecco perché è così importante sottoporsi al test, soprattutto se al momento hai o hai avuto sesso non protetto con più di un partner o uso di farmaci per via endovenosa.

I sintomi dell'HIV per le donne e per gli uomini sono spesso gli stessi; qui ci sono 16 dei segni più comuni.

Febbre:

Uno dei primi segni dell'HIV può essere una febbre lieve, fino a circa 102 gradi F. La febbre, se si verifica affatto, è spesso accompagnata da altri sintomi generalmente lievi, come affaticamento, linfonodi ingrossati e mal di gola .

A questo punto, il virus si sta muovendo nel flusso sanguigno e sta iniziando a replicarsi in gran numero. Quando ciò accade, c'è una reazione infiammatoria da parte del sistema immunitario.

Fatica:

La risposta infiammatoria generata dal sistema immunitario assediato può anche farti sentire stanco e letargico. La fatica può essere sia un segno precoce che

successivo dell'HIV.

Achy Muscles, dolori articolari, linfonodi ingrossati:

L'infezione da HIV viene spesso scambiata per influenza, mononucleosi o un'altra infezione virale, persino sifilide o epatite. Non è sorprendente. Molti dei sintomi sono gli stessi, incluso il dolore alle articolazioni e ai muscoli e alle ghiandole linfatiche gonfie.

I linfonodi fanno parte del sistema immunitario del corpo e tendono a infiammarsi quando si ha un'infezione. Molti linfonodi si trovano nell'ascella, nell'inguine e nel collo.

Gola infiammata:

Un mal di gola può essere un sintomo di un'infezione iniziale da HIV. Le persone che hanno avuto l'HIV per un po' possono anche avere mal di gola grazie a un'infezione secondaria come il mugghetto orale o il citomegalovirus, entrambi comuni nelle persone con HIV. Sintomi come questi possono spesso essere riconosciuti solo nel contesto. Se hai intrapreso comportamenti ad alto rischio o hai mal di gola cronico che non riesci a scuotere, un test HIV è una buona idea.

Eruzione cutanea:

Le eruzioni cutanee possono verificarsi all'inizio o alla fine nel corso di un'infezione da HIV e possono anche

essere un segno di AIDS. Le eruzioni cutanee possono essere batteriche o virali o causate da una crescita eccessiva di lievito che vive naturalmente sulla pelle. Questo è un altro segno del fatto che potrebbe non avere allergie al raffreddore o raffreddore. Saranno come bolle, con alcune aree rosa pruriginose sulle braccia. Le eruzioni cutanee possono anche apparire in qualsiasi parte del corpo.

Se le eruzioni cutanee non sono facilmente spiegabili o facilmente curabili, dovresti pensare di fare un test per l'HIV.

Nausea, vomito, diarrea

Tra il 30% e il 60% delle persone ha nausea, vomito o diarrea a breve termine nelle prime fasi dell'HIV. Questi sintomi possono anche apparire (e diventare cronici) come risultato della terapia farmacologica antiretrovirale e come conseguenza di un'infezione opportunistica.

La diarrea che è incessante e non risponde affatto alla terapia abituale potrebbe essere un'indicazione "dell'infezione da HIV. La diarrea e altri sintomi gastrointestinali potrebbero anche essere causati da un organismo che di solito non si vede nelle persone con un sistema immunitario sano

Perdita di peso:

Una volta chiamata "perdita di AIDS", la perdita di peso è un segno di infezione da HIV più avanzata e potrebbe essere dovuta in parte alla grave diarrea.

Se stai già perdendo peso, significa che il sistema immunitario è di solito abbastanza esaurito. I pazienti continuano a perdere molto peso anche se mangiano il più possibile. Questa è una presentazione tardiva.

Si ritiene che una persona abbia la sindrome da deperimento se perde il 10% o più del proprio peso corporeo e ha avuto diarrea o debolezza e febbre per più di 30 giorni.

Tosse secca:

Una tosse secca fu il primo segno che Ron ebbe che qualcosa non andava. Il paziente può inizialmente essere respinto come una grave allergia. Ma se è andato avanti per un anno e mezzo e ha continuato a peggiorare, allora devi essere prudente. Benadryl, antibiotici e inalatori non hanno risolto il problema. Nemmeno gli allergologi.

Questo sintomo - una tosse insidiosa che potrebbe manifestarsi per settimane che non sembra risolversi ed è tipico nelle persone con infezione da HIV in stadio avanzato o AIDS. Allo stesso tempo, può verificarsi una tosse secca per una serie di motivi non correlati all'HIV, quindi è fondamentale verificare con un

medico per scoprire cosa sta realmente succedendo.

Polmonite:

Una tosse e una inspiegabile perdita di peso possono anche presagire un'infezione più grave: la polmonite, che è spesso causata da un germe che non ti disturberà se il tuo sistema immunitario funzionasse correttamente.

Esistono molte diverse infezioni opportunistiche e ognuna può presentarsi in modo diverso, come la polmonite da pneumocystis (PCP), nota anche come "polmonite da AIDS, perché di solito le persone con un sistema immunitario sano non lo capiscono.

Esistono molti tipi diversi di polmonite,

che è un'infezione del tessuto polmonare da parte di batteri, virus o funghi. I segni di polmonite comprendono febbre alta e respiro corto. Il trattamento dipende dal tipo di polmonite diagnosticata dal medico.

Altre infezioni opportunistiche includono la toxoplasmosi, un'infezione parassitaria che colpisce il cervello; un tipo di virus dell'herpes chiamato citomegalovirus; e infezioni da lieviti come il mugghetto.

Sudorazioni notturne:

Circa la metà delle persone soffre di sudorazione notturna durante le prime fasi dell'infezione da HIV, questo sintomo dell'HIV è la reazione del corpo

quando si surriscalda o sta cercando di respingere un agente infettivo. La sudorazione notturna può essere ancora più comune dopo l'infezione e non è correlata all'esercizio fisico o alla temperatura della stanza.

Simile alle vampate di calore che soffrono le donne in menopausa, sono anche difficili da ignorare, dato che immergono le lenzuola e le lenzuola.

Cambiamenti delle unghie:

Un altro segno di tardiva infezione da HIV sono i cambiamenti delle unghie, come il clubbing (ispessimento e curvatura delle unghie), la divisione delle unghie o lo scolorimento (linee nere o marroni che vanno in verticale o

in orizzontale). Spesso ciò è dovuto a un'infezione fungina, come la candida (aka, lievito). I pazienti con un sistema immunitario impoverito saranno più sensibili alle infezioni fungine.

Infezioni da lieviti:

Un'altra infezione comune nei casi di HIV in fase avanzata è un'infezione da lievito vaginale, causata da una crescita eccessiva di candida, un tipo di lievito che vive naturalmente nella vagina. I segni includono prurito e perdite vaginali spesse.

Una crescita eccessiva di candida può anche portare a mugghetto, che è un'infezione da lievito in bocca. I sintomi del mugghetto sono chiazze

bianche nella bocca e nella gola, nonché arrossamenti, bruciore e indolenzimento. È un fungo molto comune. Il lievito tende ad apparire nella bocca o nell'esofago, rendendo difficile la deglutizione.

Un giorno il paziente può svegliarsi per trovare macchie bianche sulla lingua. Aveva il mughetto. Per lui, non è stato fastidioso a parte il fatto che non mi piaceva averlo. "L'infezione è stata difficile da eliminare, ma alla fine è stata chiarita dopo che Ron ha iniziato a prendere droghe per combattere l'HIV.

Confusione o difficoltà di concentrazione

I problemi cognitivi potrebbero essere

un segno di demenza correlata all'HIV, che di solito si verifica in ritardo nel corso dell'infezione, quando una persona ha sviluppato l'AIDS.

Oltre alla confusione e alla difficoltà di concentrazione, la demenza correlata all'HIV potrebbe anche comportare problemi di memoria e problemi comportamentali, come rabbia o irritabilità.

Può anche includere cambiamenti motori: diventare goffo, mancanza di coordinamento e problemi con compiti che richiedono abilità motorie come la scrittura a mano.

Herpes labiale o herpes genitale
L'herpes labiale (herpes orale) e

l'herpes genitale possono essere entrambi sintomi dell'infezione da HIV.

Avere l'herpes può anche essere un fattore di rischio per contrarre l'HIV.

Questo perché l'herpes può causare ulcere che facilitano l'ingresso dell'HIV nel corpo durante il sesso. Le persone che hanno l'HIV tendono ad avere focolai di herpes più gravi più spesso perché l'HIV indebolisce il sistema immunitario e rende una persona più suscettibile agli scoppi.

Formicolio e debolezza

Un sintomo meno noto dell'HIV è intorpidimento e formicolio alle mani e ai piedi. Questo si chiama neuropatia periferica, una condizione che si

verifica anche nelle persone con diabete non controllato.

Questo è quando i nervi sono effettivamente danneggiati. La neuropatia periferica può essere trattata con antidolorifici da banco e medicinali antiepilettici come Neurontin (gabapentin).

Irregolarità mestruali

L'HIV avanzato sembra aumentare la probabilità di irregolarità mestruali, come meno periodi e più leggeri. Questi cambiamenti, tuttavia, probabilmente hanno più a che fare con la perdita di peso e la cattiva salute delle donne con

infezione in fase avanzata piuttosto che con l'infezione stessa.

L'infezione da HIV è stata anche associata alla prima età della menopausa (da 47 a 48 anni per le donne infette rispetto ai 49-51 anni per le donne non infette). Le donne con HIV possono anche sperimentare effetti collaterali della menopausa più intensi, secondo una revisione dello studio.

Che aspetto hanno le lesioni cutanee da HIV?

Il tuo sistema immunitario controlla ogni parte del tuo corpo, incluso il suo organo più grande: la pelle. Le lesioni cutanee da HIV sono una risposta alle carenze della funzione immunitaria

correlate. Le lesioni cutanee possono differire in aspetto e sintomi.

Anche la gravità della tua condizione può variare e può anche coincidere con l'efficacia del tuo attuale trattamento per l'HIV.

È importante informare il medico di eventuali lesioni cutanee che noti. Il medico può aiutarti a trattarli e ad apportare modifiche al tuo piano di trattamento per l'HIV, se necessario.

Cancro

L'HIV può renderti più incline al sarcoma di Kaposi, un tipo di cancro della pelle. Forma lesioni della pelle scura lungo i vasi sanguigni e i linfonodi e può essere di colore rosso, marrone o

viola.

Questa condizione si verifica spesso nelle fasi successive dell'HIV quando la conta delle cellule T4 è bassa e il sistema immunitario è debole.

La diagnosi precoce da parte di un medico di base o di un dermatologo può aiutare a catturare precocemente questo tumore.

erpete

Se si sono formate vesciche rosse sulla bocca o sui genitali, potresti avere l'herpes correlato all'HIV.

Le epidemie sono trattate con farmaci di prescrizione per eliminare le lesioni e prevenirne la diffusione. Nei casi più gravi, le vesciche possono persino

formarsi sugli occhi. Le lesioni da herpes sono causate dallo stesso virus correlato alla varicella. Avere l'herpes aumenta il rischio di sviluppare l'herpes zoster.

Leucoplachia orale pelosa:

La leucoplachia pelosa orale è un'infezione della bocca causata da un virus della bocca. Sembra come lesioni bianche in tutta la lingua e molte delle macchie hanno un aspetto peloso.

Questo virus deriva da un sistema immunitario indebolito, motivo per cui è così comune nell'HIV.

Non esiste un trattamento diretto per le lesioni della leucoplachia pelosa orale. La risoluzione del problema si basa

invece sul piano generale di trattamento per l'HIV.

Molluscum Contagiosum:

Il mollusco contagioso è una condizione della pelle che provoca protuberanze che vanno dal colore della carne al rosa scuro. Le persone che hanno l'HIV o l'AIDS possono sperimentare un focolaio di 100 o più protuberanze alla volta. I dossi sono trattati con azoto liquido, spesso con trattamenti ripetuti; queste lesioni di solito non fanno male, ma sono estremamente contagiose.

Psoriasi:

La psoriasi è una condizione della pelle causata da problemi nel sistema immunitario, in cui le cellule della pelle

si sviluppano più velocemente di quanto dovrebbero.

Il risultato è un accumulo di cellule morte della pelle che spesso diventano di colore argento. Queste squame possono verificarsi su qualsiasi area del corpo e possono diventare rosse e infiammate senza trattamento.

Le misure di trattamento tipiche, come pomate steroide topiche, non funzionano bene nelle persone con HIV. Le creme retinoidi e la fototerapia possono essere alternative più efficaci.

Dermatite seborroica

La dermatite seborroica è spesso etichettata in modo intercambiabile con la psoriasi, ma le due condizioni non

sono uguali.

Questa condizione è più comune nelle persone con HIV, che nelle persone con psoriasi.

Questa condizione della pelle è caratterizzata da placche gialle, oleose e squamose. Se irritata, graffiata e infiammata, le squame possono aprirsi e sanguinare.

La condizione viene trattata con idrocortisone da banco o da prescrizione, ma il medico può anche prescrivere un antibiotico per ferite aperte per prevenire l'infezione.

Scabbia:

La scabbia è creata da acari chiamati *Sarcoptes scabiei*. I morsi risultanti sono

papule rosse che sono estremamente pruriginose.

Mentre la scabbia può colpire chiunque, sono particolarmente problematiche nelle persone con HIV.

Questo perché gli acari e la scabbia possono moltiplicarsi rapidamente in diverse migliaia di papule. Le lesioni sono estremamente contagiose perché gli acari possono diffondersi ad altre persone, così come ad altre parti del corpo.

Tordo:

Il mughetto è un'infezione che causa lesioni bianche all'interno di tutte le aree

della bocca, inclusa la lingua. Mentre si presenta negli stessi punti della leucoplachia pelosa orale, ha uno strato più spesso. È anche causato da un fungo, piuttosto che da un virus.



Il collutorio antifungino e i farmaci per via orale possono aiutare ad alleviare questa condizione. Questa condizione si ripresenta spesso nelle persone con

HIV. I farmaci antifungini e HIV possono aiutare a fornire sollievo.

verruche:

Nei pazienti con HIV, le verruche sono causate dal papillomavirus umano.

Possono essere color carne o sembrare piccoli granelli di cavolfiore. Se irritati, possono sanguinare, soprattutto se sono presenti verruche nelle pieghe della pelle o in bocca.

Le verruche che vengono graffiate o catturate possono diventare ferite aperte e sono suscettibili alle infezioni. Le verruche vengono rimosse chirurgicamente, ma tendono a tornare nelle persone con HIV.

Le carenze del sistema immunitario

causate dall'HIV rendono più probabile lo sviluppo di lesioni cutanee.

Parla con il tuo medico di tutte le opzioni di trattamento. Trattamenti più efficaci contro l'HIV possono anche ridurre l'insorgenza di lesioni cutanee in modo da poter avere una migliore qualità della vita.

Che aspetto hanno le ferite della bocca dell'HIV?

Le afte sono un sintomo comune dell'HIV. In effetti, tra il 32 e il 46 per cento delle persone con HIV sviluppa complicazioni della bocca a causa di un sistema immunitario indebolito.

Queste piaghe della bocca possono interferire con il benessere di una persona. Nel caso dell'HIV, queste piaghe e infezioni sono più difficili da trattare e possono anche interferire con il cibo e le medicine.

Combattere le infezioni e i virus è più difficile per una persona con l'HIV. Uno dei virus più comuni che le persone hanno è l'herpes simplex o l'herpes orale. L'herpes orale di solito appare come piaghe rosse in bocca.

Quando appaiono fuori dalle labbra, possono apparire come vesciche. Soprannominate "vesciche della febbre", questi dossi rossi e sollevati possono essere dolorosi. Sono anche conosciuti

come herpes labiale.

Chiunque può ottenere l'herpes orale, ma in una persona con HIV o un sistema immunitario indebolito, l'herpes orale può essere più grave e durare più a lungo.

Trattamento: l'herpes orale è curabile con i farmaci. Un operatore sanitario probabilmente prescriverà acyclovir, un trattamento antivirale. Questo farmaco aiuta a ridurre i nuovi focolai.

Continuare a prendere qualsiasi farmaco di prescrizione fino a quando un operatore sanitario non indichi diversamente.

Contagioso? Sì. Le persone con herpes

potrebbero voler evitare di condividere i cibi.

Ulcere aftose o piaghe da mastino

Le piaghe da masticazione sono lesioni della bocca comuni che possono causare dolore, soprattutto perché non vanno via da sole. Di solito sono rossi, ma possono anche essere coperti con una pellicola grigia o gialla. Le piaghe da masticare sono anche conosciute come ulcere aftose.

Tendono a svilupparsi all'interno delle guance, all'interno delle labbra e intorno alla lingua. Queste posizioni possono rendere le piaghe più dolorose perché si muovono quando una persona parla o mangia.

Le piaghe da masticare non sono un sintomo dell'HIV, ma avere l'HIV può aumentare il rischio di piaghe ricorrenti e gravi. Altri fattori che possono causare afte comprendono stress, cibi acidi e carenze di minerali che includono:

Ferro

Zinco

Niacina (vitamina B-3)

folato

Glutatione

Carnitina

Cobalamina (vitamina B-12)

Mangiare cibi caldi o piccanti può anche portare ad un aumento del dolore da afte.

Trattamento: in casi lievi, creme e collutori da banco (OTC) possono ridurre l'infiammazione e le piaghe. Le piaghe da masticare possono anche essere trattate con acqua salata.

Se qualcuno ha un grave caso di afte, può essere prescritto corticosteroidi sotto forma di pillola. Per i casi di piaghe prolungate che interferiscono con i pasti, provare spray anestetici topici. Questi possono aiutare a intorpidire l'area.

Contagioso? No.

Verruche del virus del papilloma umano (HPV)

L'HPV può causare verruche ovunque intorno alla bocca o alle labbra. Le

verruche possono apparire come piccole protuberanze simili a cavolfiori o masse con pieghe o sporgenze. Possono germogliare dentro e intorno alla bocca.

La maggior parte delle verruche sono bianche, ma possono anche essere rosa o grigie. Non sono generalmente dolorosi, ma possono essere fastidiosi. A seconda della loro posizione, le verruche dell'HPV possono essere raccolte e sanguinare.

L'HPV è anche fortemente associato al cancro orofaringeo o al cancro alla gola.

Trattamento: un operatore sanitario dovrà eseguire un intervento chirurgico per rimuovere le verruche. Una crema da prescrizione può essere utilizzata per

le verruche sulle labbra, ma non esistono farmaci per via orale per curare le verruche.

Contagioso? Forse, se rotto e c'è fluido.

Candidosi o mughetto

Il mughetto è un'infezione da lievito che appare come macchie bianche, giallastre o rosse ovunque all'interno della bocca.

I cerotti sono sensibili e possono sanguinare o bruciare se cancellati accidentalmente.

In alcuni casi, il mughetto provoca crepe dolorose intorno alla bocca. Questo è noto come cheilite angolare. Il mughetto può anche diffondersi alla gola, se non trattato.

Trattamento: il normale corso del

trattamento del mughetto lieve è il collutorio antifungino. Ma l'HIV può anche aumentare la resistenza di questa infezione. In tal caso, un operatore sanitario può prescrivere pillole antifungine orali.

Contagioso? No.

Malattia gengivale e bocca secca

Sebbene queste non siano piaghe, le malattie gengivali (gengivite) e la secchezza delle fauci sono problemi comuni.

La malattia gengivale provoca il rigonfiamento delle gengive e può essere dolorosa. Nei casi più gravi, può portare alla perdita di gengive o denti in

appena 18 mesi. Le malattie gengivali possono anche essere un'indicazione di infiammazione, che aumenta il rischio di malattie cardiache e ictus.

La secchezza della bocca si verifica quando una persona non produce abbastanza saliva. La saliva può aiutare a proteggere i denti e prevenire le infezioni. Senza saliva, i denti e le gengive sono vulnerabili allo sviluppo della placca. Ciò può anche peggiorare la malattia gengivale.

Trattamento: Bevi acqua, filo interdentale e spazzola costantemente per mantenere la bocca pulita e idratata. Per le malattie gengivali, un dentista rimuoverà la placca con un metodo di

pulizia profonda.

Se la bocca secca persiste, chiedere a un operatore sanitario i sostituti della saliva.

Complicanze con il trattamento dell'HIV

Le afte possono anche interferire con il trattamento dell'HIV. Avere una ridotta funzione immunitaria può aumentare la diffusione delle piaghe della bocca, che tendono a moltiplicarsi in gran numero. Questo può rendere difficile la deglutizione, causando ad alcune persone di saltare i farmaci o i pasti.

infezioni:

Le afte non trattate possono causare infezioni. Canker e herpes labiale

possono scoppiare quando una persona mangia o si lava i denti. Verruche e mughetti possono essere accidentalmente raccolti. Le ferite aperte lasciano una persona ancora più vulnerabile alle infezioni.

La secchezza delle fauci aumenta anche il rischio di infezione perché non c'è abbastanza saliva per combattere i batteri in modo naturale.

Cure orali preventive:

Uno dei modi migliori per trattare e prevenire le piaghe della bocca correlati all'HIV è vedere un dentista per controlli regolari.

Un dentista può rilevare precocemente problemi o aiutare a prevenire il

peggioramento delle piaghe. Fai loro sapere su piaghe o infezioni in corso che non scompariranno. Possono aiutare con il trattamento e la gestione dei sintomi.

Le eruzioni cutanee sono comuni quando hai un'infezione da HIV e possono avere una serie di cause

Le eruzioni cutanee possono essere un sintomo precoce dell'infezione da HIV, un risultato del sistema immunitario più debole o una reazione ai farmaci per l'HIV

Se hai un'eruzione cutanea sconosciuta e pensi di poter essere stato esposto all'HIV puoi testarlo

Fai il test ordinando un kit di test online o visitando una clinica di salute

sessuale o il tuo medico di famiglia



Potresti essere in grado di gestire i focolai dell'eruzione cutanea usando alcuni semplici cambiamenti nello stile di vita o farmaci da banco

L'eruzione da HIV è un sintomo comune dell'infezione da HIV. Circa l'85% delle persone sieropositive sperimenterà un'eruzione cutanea ad un certo punto della loro infezione, a causa di:

Infezione acuta da HIV

Un sistema immunitario indebolito
causato da infezione cronica

Una brutta reazione ai farmaci anti-
HIV

Se sei preoccupato che l'eruzione
cutanea possa essere dovuta a
un'infezione da HIV non diagnosticata,
puoi ordinare un kit per il test dell'HIV
dal nostro team di medici online e
conoscere il tuo stato entro 2 giorni.

**Eruzione cutanea acuta da HIV: un
sintomo di infezione da HIV**

Quando le persone vengono inizialmente
infettate dall'HIV, possono sperimentare

una malattia acuta, simile all'influenza, chiamata "malattia da sieroconversione", circa 2-4 settimane dopo l'infezione. L'eruzione da HIV è un sintomo di questa condizione.

L'eruzione cutanea interesserà principalmente la parte superiore del corpo e probabilmente si troverà su spalle, area del torace, viso, busto e palmi delle mani.

In genere l'eruzione cutanea sarà piatta o appena sollevata con piccoli punti / punti rossastri nelle persone con pelle chiara e viola scuro / nero nelle persone con pelle scura.

L'eruzione cutanea di solito non è pruriginosa e tende a scomparire entro 3

settimane.

Cosa fare se si nota un'eruzione cutanea da HIV

Se noti questo tipo di eruzione cutanea ed è associato ad altri sintomi acuti dell'HIV, dovresti sottoporerti immediatamente al test HIV.

Puoi ordinare un kit per il test dell'HIV online e scoprire rapidamente il tuo stato.

Farmaci da banco come la crema all'idrocortisone possono essere usati per aiutare a guarire l'eruzione cutanea e ridurre il prurito, ma dovresti sempre consultare prima un medico.

Eruzione cutanea da HIV durante l'infezione in corso

Durante l'infezione da HIV in corso, poiché il sistema immunitario viene danneggiato, si può verificare la pelle arrossata e pruriginosa (pruriginosa).

È possibile che si verifichino diverse condizioni della pelle, tra cui:

Psoriasi: Lesioni squamose su gomiti, mani e piedi. La psoriasi preesistente può anche essere esacerbata da nuove infezioni da HIV.

Dermatite seborroica: Si verifica su cuoio capelluto, orecchie, sopracciglia, ascelle toraciche, inguine e piedi.

Follicolite pustolosa eosinofila: l'acne o i brufoli possono comparire intorno ai follicoli piliferi nella parte superiore delle braccia e del torace.

Inoltre, potresti notare vesciche nelle aree "umide" del corpo come la bocca, i genitali e gli occhi.

Herpes e l'eruzione da HIV

Gli individui con sia l'HIV che l'herpes possono spesso sperimentare eruzioni cutanee da HIV molto gravi, peggiorando i sintomi e le epidemie correlate.

Le eruzioni cutanee possono apparire rosse e piene di liquido. Possono periodicamente scoppiare e crollare.

Trattamento di queste eruzioni cutanee da HIV

L'eruzione da HIV in corso può essere gestita con creme steroidee e antistaminici, ma queste condizioni

saranno difficili da sradicare completamente e la ricorrenza è comune.

La maggior parte di queste condizioni migliorerà notevolmente con un trattamento antiretrovirale efficace.

La fototerapia si è dimostrata efficace nella gestione della follicolite in alcuni pazienti.

Eruzioni cutanee dovute a farmaci per l'HIV

Le eruzioni da HIV si manifestano spesso come effetti collaterali o reazioni allergiche a determinati farmaci antiretrovirali.

Farmaco NNRTI: Provoca la maggior parte delle eruzioni cutanee, con le eruzioni cutanee con nevirapina che

sono le più gravi. Le donne corrono un rischio particolare di sviluppare eruzioni cutanee con nevirapina.

Farmaco NRTI: Abacavir può causare gravi eruzioni cutanee allergiche in alcune persone. Se sviluppa un'eruzione cutanea durante l'assunzione di Ziagen, informi immediatamente il medico.

Farmaco PI: Amprenavir e tipranavir sono entrambi noti per causare eruzioni cutanee. Le donne che assumono pillole contraccettive contenenti estrogeni sono particolarmente a rischio di sviluppare un'eruzione cutanea.

Se sviluppa un'eruzione cutanea o altri nuovi sintomi durante l'assunzione di farmaci per l'HIV, dovresti sempre

consultare immediatamente un medico.

Sindrome di Steven-Johnson (SJS) e necrolisi epidermica tossica (TEN)

SJS e TEN sono due gravi (ma rari) disturbi della pelle causati da farmaci anti-HIV. Queste sono entrambe condizioni gravi che colpiscono almeno il 30% della pelle totale del corpo e devono essere trattate immediatamente da un medico.

Sintomi di SJS e TEN:

Macchie rosse piatte o sollevate sulla pelle con vesciche centrali.

Blister in bocca, occhi e genitali.

Peeling della pelle che provoca piaghe dolorose.

Febbre, mal di testa e sentimenti generali di malessere.

Far fronte alle eruzioni cutanee da HIV indotte da farmaci:

L'eruzione da HIV può essere pruriginosa, irritante e sgradevole. Ma ci sono modi per gestire i focolai:

Evitare docce o bagni caldi.

Utilizzare solo articoli da toeletta delicati e detergenti.

Indossa fibre fresche come il cotone e stai lontano dalla lana.

Investi in un umidificatore d'aria.

Usa creme idratanti / emollienti o lozione alla calamina.



Se stai usando farmaci anti-retrovirali, dovresti davvero evitare di assumere compresse di antistaminici se non approvate dal tuo medico poiché potrebbero interferire con i farmaci.

Cosa fare a casa?

Se sono comparsi la maggior parte dei sintomi sopra menzionati, è necessario adottare le seguenti precauzioni per mitigare i segni.

Prevenire la pelle dalle intemperie
(Clod e calore)

Non sperimentare la luce solare diretta

Cerca di evitare di affrontare il calore (non sederti davanti al fuoco)

Fare sempre il bagno con acqua dolce. Il bagno caldo o il bagno con acqua fredda possono causare ulteriori irritazioni.

Evita di strofinare la pelle

Scegli il tuo sapone con molta cura

Applicare una lozione sulla pelle, in modo che la pelle non possa seccare.

Mangia cibi sani

Scegli un abito che non abbia effetti allergici sulla pelle.

Consultare regolarmente il proprio medico

I pazienti con eruzione cutanea da HIV non devono affrontare la luce solare diretta e il calore. Inoltre, non fare la doccia con acqua calda con HIV Rash.

Rimedio all'Aloe Vera:

Bene, c'è qualche tipo di eruzione cutanea o irritazione sulla pelle che la buona vecchia Aloe Vera non cambierà. Sembra che questa piccola foglia sia

come il rimedio dell'esercito svizzero per tutte le condizioni della pelle in questi giorni. Bene, procurati una foglia di Aloe Vera e spremi il succo all'interno sull'eruzione cutanea che hai. Una fascia sottile (come un cerotto naturale) si formerà sulla zona interessata. Se non riesci a mettere le mani su una foglia, scegli semplicemente la forma in gel, sfortunatamente non sarà altrettanto efficace, ma questo è ancora uno dei rimedi naturali più antichi e migliori per l'eruzione cutanea.

Rimedio all'olio d'oliva:

Come il gel di Aloe Vera, l'olio d'oliva è un ottimo rimedio casalingo per le eruzioni cutanee e dovrebbe essere

applicato direttamente sulla pelle. Se non hai olio d'oliva, puoi anche usare olio di fegato di merluzzo e persino olio di vitamina E.

Rimedio al lievito:

Per fornire un sollievo efficace e immediato da prurito e irritazione, applicare un po' di lievito sulla zona interessata.

Witch Hazel Remedy:

Vai a prenderti una pinta di acqua leggermente calda e mettilci dentro un'oncia di corteccia di amamelide. Lasciare agire per 15 minuti e quindi lasciarlo sobbollire per un altro minuto o due. Quando la miscela è fredda,

applicare sull'eruzione cutanea con un panno pulito e lasciare sulla pelle per una buona mezz'ora. Alcuni usano questo rimedio per condizioni gravi come l'eczema, quindi puoi essere certo che è stato usato come rimedio naturale anche per l'eruzione cutanea.

Bagno di farina d'avena rimedio:



Hai sentito parlare di questo rimedio per le eruzioni cutanee? Sì, versa 2-3 tazze di farina d'avena cruda nel bagno e immergiti fino a quando ti senti a tuo agio. Dopo un paio di bagni inizierai a vedere che l'eruzione cutanea scompare. Riceverai anche un sollievo immediato dall'irritazione e anche dal prurito ... come è per alcuni rimedi naturali per l'eruzione cutanea per te.

Rimedi naturali per curare il prurito

Se hai usato prodotti per la cura della pelle tradizionali per risolvere irritazioni cutanee come prurito ed eruzioni cutanee senza successo, non temere! Il seguente elenco dei 7 migliori rimedi a base di erbe può aiutarti a curare il prurito.

Prima di saltare ai rimedi naturali per l'eruzione cutanea pruriginosa, è importante capire quale potrebbe essere il colpevole in modo da poter prevenire ulteriori focolai.

Per quanto strano possa sembrare, gli ingredienti e le sostanze chimiche utilizzati nella maggior parte dei

prodotti per la cura della pelle sono di gran lunga la principale causa di irritazione e eruzioni cutanee. Sì, proprio i prodotti che usi per prenderti cura della tua pelle possono in effetti essere la fonte del tuo prurito.

Per ulteriori informazioni su questo argomento molto importante, ti consiglio di controllare le etichette degli ingredienti sui tuoi attuali prodotti per la cura della pelle con le migliori 160 tossine per la cura della pelle elencate in ordine alfabetico presso Natural Skincare Authority.



I migliori rimedi naturali per un'eruzione cutanea pruriginosa

1. Witch Hazel: Agisce come un astringente che allevia un'eruzione cutanea pruriginosa e condizioni della pelle più gravi come la psoriasi e l'eczema. A causa delle sue proprietà antiossidanti è anche usato per trattare le

scottature solari. Per il massimo beneficio, usa la corteccia di amamelide fresca. Fai bollire un'oncia della corteccia con una pinta di acqua e lascia per dieci minuti. Filtrare e raffreddare. Applicare con un panno pulito e lasciarlo acceso per 30 minuti.

2. Erba di San Giovanni: Questo fiore giallo originario dell'Europa è stato usato per migliaia di anni, dai greci ai nativi americani, è ben noto per l'uso nel trattamento della depressione e dell'ansia, anche se a causa delle sue proprietà astringenti può anche essere usato per idratare e rinfrescare il pelle, in particolare un'eruzione cutanea pruriginosa.

3. Aloe Vera: Questa è una sostanza gelatinosa del taglio L'aloè è ampiamente conosciuta per il trattamento di scottature e scottature. L'aloè vera aiuta anche a guarire le ferite e le irritazioni cutanee minori come un prurito cutaneo. Questa pianta produce proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antimicotiche. Contiene anche acido folico, zinco e vitamine C ed E. Il modo migliore per ottenere i benefici dell'aloè vera è usare il gel fresco della pianta. Al momento dell'applicazione, tagliare una porzione della foglia e applicare direttamente il gel sulla zona interessata.

4. Olio essenziale di calendula: La

calendula è ampiamente usata per ridurre l'infiammazione e il trattamento dell'eruzione da pannolino. Gli esperti affermano che la Calendula agisce stimolando la produzione di globuli bianchi che aiutano a distruggere i microbi dannosi. Puoi anche usare l'erba reale mescolandola con acqua bollente, una tazza di acqua bollente in due cucchiaini di erba. Lascialo sobbollire per circa dieci minuti. Dopo che la miscela si è raffreddata, applicare sulla zona interessata usando un panno pulito.

5. Olio essenziale di camomilla: Ha proprietà anti-infiammatorie (anti-microbiche) che lenisce ed elimina un'eruzione cutanea pruriginosa e

irritazioni. La camomilla è anche usata nel trattamento dell'eczema, della psoriasi e delle scottature solari. Si noti che le persone che sono normalmente allergiche all'erba e all'ambrosia possono acquisire una reazione allergica alla camomilla.

6. Jewelweed: Fornisce sollievo da quercia velenosa, eruzione cutanea di edera velenosa, punture di insetti e punture di api. Per usare, schiaccia le foglie fresche in una palla e strofina sull'eruzione il più rapidamente possibile

7. Pansé selvatica: Questo è un fiore selvatico europeo che lenisce e allevia il prurito e le irritazioni della pelle

associate all'eczema. Questo è anche usato per lenire i problemi di acne.

Per un prodotto naturale alternativo ai prodotti per la cura della pelle tradizionali altamente tossici, fare clic su questo elenco può anche fungere da elenco di controllo degli ingredienti per valutare i potenziali prodotti.

Spero che possa aiutare a identificare le eruzioni cutanee da HIV e potresti essere in grado di trovare la tua risposta su come si sente l'HIV Rash. Sii benedetto.

DISCLAIMER

Questo eBook informativo non

sostituisce la prevenzione, la diagnosi o il trattamento medico professionale.

Si prega di consultare il proprio medico, farmacista o operatore sanitario prima di prendere qualsiasi rimedio a casa o integratori o seguire qualsiasi trattamento suggerito qui.

Solo il tuo fornitore di assistenza sanitaria, medico personale o farmacista può fornirti consigli su ciò che è sicuro ed efficace per le tue esigenze specifiche o diagnosticare la tua storia medica particolare .